

enlèvement de la plante



description de la technique

→ l'arrachage de la plante se fait simplement en tirant dessus à la base du plant, ce qui permet d'extraire aussi les racines.

protocole opératoire

opération initiale

1- Fin printemps :

→ arracher manuellement les plantes en tirant simplement dessus.

2-Milieu d'été :

→ renouveler l'opération d'arrachage manuel.

reprises

→ renouveler l'opération initiale pendant quelques années jusqu'à épuisement du stock de graines.

risque de dissémination

→ risque de bouturage des tiges : c'est pourquoi les tiges arrachées doivent être déplacées pour éviter qu'elles ne bouturent, fleurissent et produisent des graines dans la zone humide ou le cours d'eau.

gestion des rémanents

→ déplacer les tiges arrachées pour les déposer sur un sol non humide à proximité.

conseils

Les opérateurs doivent être formés tous les ans à l'identification des balsamines pour ne pas se tromper d'espèce. Sans les fleurs, il y a un risque important de confusion avec la balsamine des bois, espèce indigène. Dans le doute sur la compétence des opérateurs pour distinguer les deux plantes, il est préférable de renoncer à l'opération.



Illustrations :

- a) secteur envahi par la balsamine de l'Himalaya,
- b) plantule dans une roselière,
- c) arrachage de plants.